

有关家属，接触者的检查

我得了结核，但其他人都是很健康。为什么家属、接触者必须做检查呢？

结核是结核菌引起的疾病。但多数的活动性结核患者只表现出轻微的症状，连自己得了结核都不知道却已经将结核菌传染给了他人。

容易感染结核的人是，亲友、同事等每天长时间在一起的人。有一个人查出了结核，就必须弄清他有没有传染给他人，或有没有同时发病的人。这样患结核的人可以尽早开始治疗，减少损害，缩短治疗时间。还可以防止接连不断地传染给他人。

谁是被检查的对象呢？

每天长时间在一起的人容易感染结核，所以，亲友、同事等将成为被检查的对象。

实际上哪个人要做检查，是根据患者的症状、接触状况等选择感染危险性高的人，由保健所长（医生）来决定。（以亲属为主。）

检查的时期和次数。

检查的时期和次数根据患者的排菌情况（感染性）而不同。

临近检查时您所在地区的保健所会寄给您说明书。保健所的检查是免费的。

患者的痰中检查出结核菌时

根据年龄、症状、接触状况等感染危险度高的亲属、同事有必要做2年的追踪检查。

这是因为感染结核后，多数在6至18个月内发病。


为做出早期诊断，有必要做定期检查。

肺以外の結核患者，痰中检查不出結核菌时
在患者开始治疗 2 个月以内做检查。

亲属、同事感染的可能性很低，检查无异常则不用做追踪检查。

即使检查结束后，也要普通人一样每做一次健康诊断。可以在工作单位、市役所、保健所等做检查。

另外，咳嗽、咳痰持续 2 周以上时，一定要做胸部放射线及痰检查。



家属、接触者的检查内容是什么？

检查的内容因年龄而异。

18 岁以上的人

- 胸部 X 光检查 (X 光片) : 检查肺有无损害 (病灶) 。
- 咳痰检查 (只在有症状时) : 检查痰中是否有结核菌。
- 29 岁以下，有可能感染结核菌的人做结核菌素反应试验。

不满 18 岁的人

- 结核菌素反应试验: 检查有无感染结核菌。但是，并不能知道是否发病。接种 BCG (疫苗) 的人有时检查结果不好判断。到目前为止的 BCG (预防接种)，结核菌素试验的结果将有助于判断。
- 胸部 X 光线检查 (X 光片) : 检查肺有无损害 (病灶) 。
- 咳痰检查 (只在有症状时) : 检查痰中是否有结核菌。

检查结果出来后还应该怎么办？

被认定为发病的人要到医疗机构去商谈，作为患者接受治疗。

没发病但被怀疑感染时，要到医疗机构做预防性治疗 (预防口服) 。